

## Медляк Бекмана

- жук, занесенный в Красную книгу. Очень редкий вид - один из двух представителей Кавказского рода *Caenoblaps* и эндемичный для склонов Внутреннего Дагестана. По внешнему облику вид имеет большое сходство с чернотелками рода *Blaps*, но присутствие на внутренней поверхности передних бедер сильно развитого зубца позволяет отнести его к роду *Caenoblas*. Голова наиболее широкая на уровне щек. Передний край наличника относительно глубоко дуговидно-выемчатый. Наличник в равномерной мелкой простой пунктировке отделен от лба тонким, трапециевидно-изогнутым фронтоклипеальным швом. Длина тела 14,7-19 мм, ширина 5,5 мм. Надкрылья удлинненные с наибольшей шириной в задней трети. На вершине надкрылья оттянуты, вдоль шва крышевидно не приподняты. Поверхность надкрылий в мелкой равномерной пунктировке и в слабой поперечной морщинистости. Жуки появляются в конце апреля, до конца августа.

## МЕДЛЯК БЕКМАНА



*Caenoblaps baekmanni* Sch.

Отряд: Жесткокрылые

Coleoptera

Семейство: Чернотелки

Tenebrionidae

Статус: I категория. Очень редкий вид - один из двух представителей Кавказского рода *Caenoblaps* и эндемичный для склонов Внутреннего Дагестана. Распространение. В Дагестане ареал охватывает юго-западную

часть Богосского хребта: Инхоквари, Эчеда, Хонох, Хварши, Мазада, Тлядадь.

Места обитания. Сухие склоны. Убежища под камнями, встречается также близ жилья человека, в старых разрушенных постройках.

Численность и причины ее изменения. Очень малочисленный вид.

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, выпас скота, разрушение убежищ.

Особенности биологии и экологии. По внешнему облику вид имеет большое сходство с чернотелками рода *Blaps*, но присутствие на внутренней поверхности передних бедер сильно развитого зубца позволяет отнести его к роду *Caenoblas*. Голова наиболее широкая на уровне щек. Передний край наличника относительно глубоко дуговидно-выемчатый. Наличник в равномерной мелкой простой пунктировке отделен от лба тонким, трапециевидно-изогнутым фронтоклипеальным швом. Длина тела 14,7-19 мм, ширина 5,5 мм. Надкрылья удлинненные с наибольшей шириной в задней трети. На вершине надкрылья оттянуты, вдоль шва крышевидно не приподняты. Поверхность надкрылий в мелкой равномерной пунктировке и в слабой поперечной морщинистости. Жуки появляются в конце апреля, до конца августа.

Необходимые меры охраны. Запрет отлова. Уточнение мест обитания, пропаганда охраны данного вида.